

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de France métropolitaine

Statuts établis en 2016 pour les oiseaux nicheurs et en 2011 pour les oiseaux hivernants et de passage

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France | Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------|----------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aix galericulata</i> | Canard mandarin | NA ^a | | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Ouette d'Égypte | NA ^a | | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas acuta</i> | Canard pilet | NA ^b | LC | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas crecca</i> | Sarcelle d'hiver | VU D1 ? | LC | NA ^d | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas platyrhynchos</i> | Canard colvert | LC ? | LC | NA ^d | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser albifrons</i> | Oie rieuse | | NA ^c | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser anser</i> | Oie cendrée | VU D1 ↗ | LC | NA ^d | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser brachyrhynchus</i> | Oie à bec court | | NA ^b | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser fabalis</i> | Oie des moissons | | VU B1ab(iv,v) | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya collaris</i> | Fuligule à bec cerclé | | NA ^c | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya ferina</i> | Fuligule milouin | VU C1 ↘ | LC | NA ^c | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya fuligula</i> | Fuligule morillon | LC ↗ | NT pr. A2b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya marila</i> | Fuligule milouinan | | NT pr. B2ac(iv) D1 | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya nyroca</i> | Fuligule nyroca | NA ^b | NA ^c | NA ^c | NT |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Branta bernicla</i> | Bernache cravant | | LC | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Branta canadensis</i> | Bernache du Canada | NA ^a | NA ^a | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Branta leucopsis</i> | Bernache nonette | | NA ^c | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Bucephala clangula</i> | Garrot à œil d'or | NA ^b | NA ^c | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Clangula hyemalis</i> | Harelde boréale | | NA ^c | NA ^c | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus columbianus</i> | Cygne de Bewick | | EN D | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France | Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus cygnus</i> | Cygne chanteur | NA ^b | NA ^c | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Cygnus olor</i> | Cygne tuberculé | LC ↗ | NA ^c | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mareca penelope</i> | Canard siffleur | NA ^b | LC | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mareca strepera</i> | Canard chipeau | LC ↗ | LC | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Sarcelle marbrée | RE | | NA ^b | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta fusca</i> | Macreuse brune | | EN B2ab(v) | | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta nigra</i> | Macreuse noire | | LC | NA ^c | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mergellus albellus</i> | Harle piette | | VU D1 | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus merganser</i> | Harle bièvre | NT VU D1 (-1) ↗ | LC | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mergus serrator</i> | Harle huppé | CR D → | LC | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Netta rufina</i> | Nette rousse | LC ↗ | LC | NA ^d | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Erismature rousse | NA ^a | | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura leucocephala</i> | Erismature à tête blanche | RE | | NA ^b | EN |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Somateria mollissima</i> | Eider à duvet | CR A2a B2b(iii)c(ii,iii,iv) D ? | NA ^c | | NT |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Spatula clypeata</i> | Canard souchet | LC ↗ | LC | NA ^d | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Spatula querquedula</i> | Sarcelle d'été | VU C1 D1 ↘ | | NT pr. A2b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Tadorna ferruginea</i> | Tadorne casarca | NA ^a | | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Tadorna tadorna</i> | Tadorne de Belon | LC ↗ | LC | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Alectoris graeca</i> | Perdrix bartavelle | NT pr. C1 ? | | | NT |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Alectoris rufa</i> | Perdrix rouge | LC ↘ | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Bonasa bonasia</i> | Gélinotte des bois | NT pr. C → | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Coturnix coturnix</i> | Caille des blés | LC ↘ | | NA ^d | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Lagopus muta</i> | Lagopède alpin | NT pr. C1 ↘ | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Lyrurus tetrix</i> | Tétras lyre | NT pr. C1 ↘ | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Perdix perdix</i> | Perdrix grise | LC ↘ | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Phasianus colchicus</i> | Faisan de Colchide | LC ? | | | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Syrnaticus reevesii</i> | Faisan vénéré | NA ^a | | | VU |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Tetrao urogallus</i> | Grand Tétras | VU C1 ↘ | | | LC |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Callipepla californica</i> | Colin de Californie | NA ^a | | | LC |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Colinus virginianus</i> | Colin de Virginie | NA ^a | | | NT |
| Gaviiformes | Gaviidae | <i>Gavia adamsii</i> | Plongeon à bec blanc | | NA ^b | | NT |
| Gaviiformes | Gaviidae | <i>Gavia arctica</i> | Plongeon arctique | | NA ^c | DD | LC |
| Gaviiformes | Gaviidae | <i>Gavia immer</i> | Plongeon imbrin | | VU D1 | | LC |
| Gaviiformes | Gaviidae | <i>Gavia stellata</i> | Plongeon catmarin | | NA ^c | DD | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France | Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps auritus</i> | Grèbe esclavon | | VU D1 | | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps cristatus</i> | Grèbe huppé | LC ↗ | NA ^c | | LC |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps grisegena</i> | Grèbe jougris | CR D → | NA ^c | | LC |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podiceps nigricollis</i> | Grèbe à cou noir | LC → | LC | | LC |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Grèbe castagneux | LC → | NA ^d | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Calonectris diomedea</i> | Puffin cendré | VU D2 → | NA ^b | NA ^d | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Fulmarus glacialis</i> | Fulmar boréal, Pétrel fulmar | NT pr. A2a C ↘ | NA ^c | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus gravis</i> | Puffin majeur | | | NA ^d | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus griseus</i> | Puffin fuligineux | | | NA ^d | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus mauretanicus</i> | Puffin des Baléares | | NA ^b | VU C1 | CR |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus puffinus</i> | Puffin des anglais | EN B2ab(iii) → | | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus yelkouan</i> | Puffin yelkouan | EN B2ab(iii) → | NA ^d | DD | VU |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Océanite tempête, Pétrel tempête | VU C1 ? | | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Morus bassanus</i> | Fou de Bassan | NT VU D2 (-1) ↗ | | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Cormoran huppé | LC ↗ | NA ^d | | LC |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Grand Cormoran | LC ↗ | LC | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea alba</i> | Grande Aigrette | NT VU D1 (-1) ↗ | LC | | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea cinerea</i> | Héron cendré | LC ↗ | NA ^c | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea purpurea</i> | Héron pourpré | LC ↗ | | | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardeola ralloides</i> | Crabier chevelu, Héron crabier | LC ↗ | | | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Botaurus stellaris</i> | Butor étoilé | VU D1 ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Bubulcus ibis</i> | Héron garde-bœufs | LC ↗ | NA ^c | | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta garzetta</i> | Aigrette garzette | LC ↗ | NA ^c | | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ixobrychus minutus</i> | Blongios nain, Butor blongios | EN A2a C1+2a(i) ↘ | | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Bihoreau gris, Héron bihoreau | NT pr. C1 ? | NA ^c | | LC |
| Pelecaniformes | Ciconiidae | <i>Ciconia ciconia</i> | Cigogne blanche | LC ↗ | NA ^c | NA ^d | LC |
| Pelecaniformes | Ciconiidae | <i>Ciconia nigra</i> | Cigogne noire | EN D ↗ | NA ^c | VU D1 | LC |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Platalea leucorodia</i> | Spatule blanche | NT pr. B2a ↗ | VU D1 | NA ^c | LC |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle | NT VU D2 (-1) ↗ | | | LC |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | Ibis sacré | NA ^a | | | LC |
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Flamant rose | VU CR B2ac(ii,iv) (-2) → | NA ^d | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter gentilis</i> | Autour des palombes | LC → | NA ^c | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Accipiter nisus</i> | Epervier d'Europe | LC → | NA ^c | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aegypius monachus</i> | Vautour moine | EN D ↗ | | NA ^b | NT |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila chrysaetos</i> | Aigle royal | VU | D1 | ↗ | | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila fasciata</i> | Aigle de Bonelli | EN | A2a D | → | | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo buteo</i> | Buse variable | LC | | → | NA ^c | NA ^c | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo lagopus</i> | Buse pattue | | | | NA ^c | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo rufinus</i> | Buse féroce | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circaetus gallicus</i> | Circaète Jean-le-Blanc | LC | | → | | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus aeruginosus</i> | Busard des roseaux | NT | pr. C1 | ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus cyaneus</i> | Busard Saint-Martin | LC | | → | NA ^c | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus pygargus</i> | Busard cendré | NT | pr. C | ↘ | | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Clanga pomarina</i> | Aigle pomarin | NA ^b | | | | NA ^b | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Elanus caeruleus</i> | Elanion blanc | VU | D1 | ↗ | | NA ^b | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Gypaetus barbatus</i> | Gypaète barbu | EN | D | → | | | NT |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Gyps fulvus</i> | Vautour fauve | LC | | ↗ | | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Pygargue à queue blanche | CR | D | → | NA ^d | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Aigle botté | NT | pr. D1 | ? | NA ^c | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Milvus migrans</i> | Milan noir | LC | | ↗ | | NA ^d | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Milvus milvus</i> | Milan royal | VU | C1 | → | VU A2b C1 | NA ^c | NT |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Neophron percnopterus</i> | Vautour percnoptère | EN | D | ↗ | | | EN |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pernis apivorus</i> | Bondrée apivore | LC | | → | | LC | LC |
| Accipitriformes | Pandionidae | <i>Pandion haliaetus</i> | Balbusard pêcheur | VU | EN D (-1) | ↗ | NA ^c | LC | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco columbarius</i> | Faucon émerillon | | | | DD | NA ^d | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco naumanni</i> | Faucon crécerellette | VU | D1 | ↗ | | NA ^d | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco peregrinus</i> | Faucon pèlerin | LC | | ↗ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco subbuteo</i> | Faucon hobereau | LC | | ↗ | | NA ^d | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco tinnunculus</i> | Faucon crécerelle | NT | pr. A2b | ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco vespertinus</i> | Faucon kobez | NA ^b | | | | NA ^d | NT |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Crex crex</i> | Râle des genêts | EN | A2a C1 | ↘ | | NA ^d | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica atra</i> | Foulque macroule | LC | | ↗ | NA ^c | NA ^c | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallinula chloropus</i> | Gallinule poule d'eau, Poule d'eau | LC | | ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio porphyrio</i> | Talève sultane, Poule sultane | VU | D1 | ↗ | | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana parva</i> | Marouette poussin | CR | B2ab(iii)c(ii,iii,iv) D | ? | | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana porzana</i> | Marouette ponctuée | VU | D1 | ? | NA ^d | NA ^d | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana pusilla</i> | Marouette de Baillon | CR | B2ab(iii)c(ii,iii,iv) D | ? | | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Rallus aquaticus</i> | Râle d'eau | NT | pr. A2c C1 | ? | NA ^d | NA ^d | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | | Oiseaux hivernants | | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|---|---|--------------|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | | Catégorie et critère Liste rouge France | | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Gruiformes | Gruidae | <i>Grus grus</i> | Grue cendrée | CR | D | ↗ | NT | VU (D2) (-1) | NA ^c | LC |
| Otidiformes | Otididae | <i>Otis tarda</i> | Outarde barbue, Grande Outarde | RE | | | | | NA ^b | VU |
| Otidiformes | Otididae | <i>Tetrax tetrax</i> | Outarde canepetière | EN | A2a | ↘ | NA ^c | | | NT |
| Charadriiformes | Haematopodidae | <i>Haematopus ostralegus</i> | Huitrier pie | LC | | ↗ | LC | | | NT |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | <i>Himantopus himantopus</i> | Echasse blanche | LC | | ↗ | | | | LC |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocette élégante | LC | | ↗ | LC | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Burhinidae | <i>Burhinus oedicephalus</i> | Œdicnème criard | LC | | → | NA ^d | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Glareolidae | <i>Glareola pratincola</i> | Glaréole à collier | EN | D | ? | | | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Gravelot à collier interrompu | VU | B2b(i,ii,iii)c(iv) | → | NA ^c | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius dubius</i> | Petit Gravelot | LC | | → | | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius hiaticula</i> | Grand Gravelot | VU | D1 | → | LC | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Eudromias morinellus</i> | Pluvier guignard | RE | | | | | NT | pr. A2b |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis apricaria</i> | Pluvier doré | | | | LC | | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis squatarola</i> | Pluvier argenté | | | | LC | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus vanellus</i> | Vanneau huppé | NT | pr. A2b | ↘ | LC | | NA ^d | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Actitis hypoleucos</i> | Chevalier guignette | NT | pr. D1 | ? | NA ^c | | DD | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepierre à collier | | | | LC | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alba</i> | Bécasseau sanderling | | | | LC | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alpina</i> | Bécasseau variable | | | | LC | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris canutus</i> | Bécasseau maubèche | | | | NT | pr. D2 | DD | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris ferruginea</i> | Bécasseau cocorli | | | | | | LC | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris maritima</i> | Bécasseau violet | | | | NA ^c | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris minuta</i> | Bécasseau minute | | | | NA ^c | | LC | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris pugnax</i> | Combattant varié, Chevalier combattant | NA ^b | | | NA ^c | | NT | pr. C1 |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris temminckii</i> | Bécasseau de Temminck | | | | | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago gallinago</i> | Bécassine des marais | CR | C1+2a(i) D | ↘ | DD | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa lapponica</i> | Barge rousse | | | | LC | | NA ^c | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa limosa</i> | Barge à queue noire | VU | B2ab(ii,iii,iv) D1 | → | NT | pr. D2 | VU | B2ab(v) |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Lymnocyptes minimus</i> | Bécassine sourde | | | | DD | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius arquata</i> | Courlis cendré | VU | C1 | → | LC | | NA ^d | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius phaeopus</i> | Courlis corlieu | | | | NA ^c | | VU | B2ab(v) |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Phalarope à bec large | | | | | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Scolopax rusticola</i> | Bécasse des bois | LC | | → | LC | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa erythropus</i> | Chevalier arlequin | | | | NA ^c | | DD | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France | Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa glareola</i> | Chevalier sylvain | | | LC | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa nebularia</i> | Chevalier aboyeur | | NA ^c | LC | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa ochropus</i> | Chevalier culblanc | | NA ^c | LC | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa totanus</i> | Chevalier gambette | LC → | NA ^c | LC | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Labbe à longue queue | | | VU D1 | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Labbe parasite | | NA ^d | LC | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius pomarinus</i> | Labbe pomarin | | NA ^d | LC | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius skua</i> | Grand Labbe | | NA ^d | LC | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chlidonias hybrida</i> | Guifette moustac | VU B1ac(iii) → | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chlidonias leucopterus</i> | Guifette leucoptère | NA ^b | | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chlidonias niger</i> | Guifette noire | EN C1 ↘ | | DD | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus genei</i> | Goéland railleur | VU D2 → | NA ^c | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Mouette rieuse | NT pr. A2a ↘ | LC | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterne hansel | VU EN B2ac(iv) (-1) ↗ | | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | Mouette pygmée | NA ^b | LC | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Hydroprogne caspia</i> | Sterne caspienne | | | NT pr. D1 | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Ichthyaetus audouinii</i> | Goéland d'Audouin | EN B2ab(v) D ↘ | | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> | Mouette mélanocéphale | LC ↗ | NA ^c | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus argentatus</i> | Goéland argenté | NT pr. A2a ↘ | NA ^c | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus cachinnans</i> | Goéland pontique | | NA ^c | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus canus</i> | Goéland cendré | EN D → | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus fuscus</i> | Goéland brun | LC → | LC | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus hyperboreus</i> | Goéland bourgmestre | | NA ^c | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus marinus</i> | Goéland marin | LC ↗ | NA ^c | NA ^c | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus michahellis</i> | Goéland leucophée | LC ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Rissa tridactyla</i> | Mouette tridactyle | VU D2 → | NA ^d | DD | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna dougallii</i> | Sterne de Dougall | CR B2b(v)c(iii,iv) C2a(i)b ↘ | | NT pr. D1 | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna hirundo</i> | Sterne pierregarin | LC ↗ | NA ^d | LC | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna paradisaea</i> | Sterne arctique | CR B2b(iii)c(ii,iii,iv) D ? | | LC | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sternula albifrons</i> | Sterne naine | LC → | | LC | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Sterne caugek | NT pr. B2b(iii) D2 → | NA ^c | LC | LC |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Alca torda</i> | Pingouin torda | CR B2ab(iii) ? | DD | | NT |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Alle alle</i> | Mergule nain | | NA ^c | | LC |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Cephus grylle</i> | Guillemot à miroir | | NA ^c | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale | |
|------------------|---------------|------------------------------|---|---|-----------------|---|---|--------------------------------|----|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | | |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Fratercula arctica</i> | Macareux moine | CR | A2a B2ab(iii,v) | ↘ | NA ^d | | VU |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Uria aalge</i> | Guillemot de Troïl | EN | B2ab(iii) | → | DD | NA ^d | LC |
| Pterocliiformes | Pteroclididae | <i>Pterocles alchata</i> | Ganga cata | CR | B1ab(iii,v) | ↘ | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba livia</i> | Pigeon biset | DD | | ? | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba oenas</i> | Pigeon colombin | LC | | ↗ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba palumbus</i> | Pigeon ramier | LC | | ↗ | LC | NA ^d | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia decaocto</i> | Tourterelle turque | LC | | ↗ | | NA ^d | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia turtur</i> | Tourterelle des bois | VU | A2b | ↘ | | NA ^c | VU |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacula krameri</i> | Perruche à collier | NA ^a | | | | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Clamator glandarius</i> | Coucou geai | LC | | → | | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Cuculus canorus</i> | Coucou gris | LC | | ↘ | | DD | LC |
| Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Effraie des clochers, Chouette effraie | LC | | ? | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Aegolius funereus</i> | Chouette de Tengmalm | LC | | ? | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Asio flammeus</i> | Hibou des marais | VU | END (-1) | ? | NA ^c | NA ^c | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Asio otus</i> | Hibou moyen-duc | LC | | ? | NA ^d | NA ^d | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Athene noctua</i> | Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche | LC | | → | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Bubo bubo</i> | Grand-duc d'Europe | LC | | ↗ | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Glaucidium passerinum</i> | Chevêchette d'Europe | NT | pr. D1 | ? | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Otus scops</i> | Petit-duc scops | LC | | ? | | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Strix aluco</i> | Chouette hulotte | LC | | ? | NA ^c | | LC |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Engoulevent d'Europe | LC | | ? | | NA ^c | LC |
| Caprimulgiformes | Apodidae | <i>Apus apus</i> | Martinet noir | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Caprimulgiformes | Apodidae | <i>Apus pallidus</i> | Martinet pâle | LC | | ? | | | LC |
| Caprimulgiformes | Apodidae | <i>Tachymarptis melba</i> | Martinet à ventre blanc | LC | | → | | | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Alcedo atthis</i> | Martin-pêcheur d'Europe | VU | A2b | ↘ | NA ^c | | LC |
| Coraciiformes | Meropidae | <i>Merops apiaster</i> | Guêpier d'Europe | LC | | ? | | NA ^d | LC |
| Coraciiformes | Coraciidae | <i>Coracias garrulus</i> | Rollier d'Europe | NT | pr. D1 | ↗ | | NA ^d | LC |
| Bucerotiformes | Upupidae | <i>Upupa epops</i> | Huppe fasciée | LC | | ↗ | NA ^d | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos leucotos</i> | Pic à dos blanc | VU | D1 | → | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos major</i> | Pic épeiche | LC | | ↗ | NA ^d | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos medius</i> | Pic mar | LC | | ↗ | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos minor</i> | Pic épeichette | VU | A2b | ↘ | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryocopus martius</i> | Pic noir | LC | | ↗ | | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|---------------|----------------------------------|--|---|-----------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Piciformes | Picidae | <i>Jynx torquilla</i> | Torcol fourmilier | LC | | → | NA ^c | NA ^c | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Picoides tridactylus</i> | Pic tridactyle | CR | D | ? | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Picus canus</i> | Pic cendré | EN | A2b | ↘ | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Picus viridis</i> | Pic vert | LC | | → | | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Alauda arvensis</i> | Alouette des champs | NT | pr. A2b | ↘ | LC | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Calandrella brachydactyla</i> | Alouette calandrelle | EN | A2b C1 | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Eremophila alpestris</i> | Alouette haussecol | | | | NA ^c | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Galerida cristata</i> | Cochevis huppé | LC | | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Galerida theklae</i> | Cochevis de Thékla | EN | B(1+2)ab(iii,v) | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Lullula arborea</i> | Alouette lulu | LC | | ↘ | NA ^c | | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Melanocorypha calandra</i> | Alouette calandre | EN | B2ab(iii) | ↗ | | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Cecropis daurica</i> | Hirondelle rousseline | VU | D1 | ↗ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Delichon urbicum</i> | Hirondelle de fenêtre | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Hirundo rustica</i> | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Hirondelle de rochers | LC | | → | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Riparia riparia</i> | Hirondelle de rivage | LC | | → | | DD | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus campestris</i> | Pipit rousseline | LC | | ? | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus cervinus</i> | Pipit à gorge rousse | | | | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus petrosus</i> | Pipit maritime | NT | pr. C | → | NA ^c | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus pratensis</i> | Pipit farlouse | VU | A2b | ↘ | DD | NA ^d | NT |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus spinoletta</i> | Pipit spioncelle | LC | | ? | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus trivialis</i> | Pipit des arbres | LC | | ↗ | | DD | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla alba</i> | Bergeronnette grise | LC | | → | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla cinerea</i> | Bergeronnette des ruisseaux | LC | | ↘ | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla flava</i> | Bergeronnette printanière | LC | | ↗ | | DD | LC |
| Passeriformes | Cinclidae | <i>Cinclus cinclus</i> | Cincla plongeur | LC | | → | | | LC |
| Passeriformes | Prunellidae | <i>Prunella collaris</i> | Accenteur alpin | LC | | → | | | LC |
| Passeriformes | Prunellidae | <i>Prunella modularis</i> | Accenteur mouchet | LC | | → | NA ^c | | LC |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodyte mignon | LC | | ↘ | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Erithacus rubecula</i> | Rougegorge familier | LC | | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula albicollis</i> | Gobemouche à collier | NT | pr. C1 | ? | | | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Gobemouche noir | VU | C1+2a(i) | ? | | DD | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Rossignol philomèle | LC | | ↗ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia svecica</i> | Gorgebleue à miroir | LC | | ↗ | | NA ^c | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Monticola saxatilis</i> | Monticole de roche, Merle de roche | NT | pr. C2b | ↘ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Monticola solitarius</i> | Monticole bleu, Merle bleu | LC | | → | | | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Muscicapa striata</i> | Gobemouche gris | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe hispanica</i> | Traquet oreillard | EN | A2b | ↘ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe leucura</i> | Traquet rieur | RE | | | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Traquet motteux | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Rougequeue noir | LC | | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Rougequeue à front blanc | LC | | ↗ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola rubetra</i> | Tarier des prés, Traquet tarier | VU | A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola rubicola</i> | Tarier pâtre, Traquet pâtre | NT | pr. A2b | ↘ | NA ^d | NA ^d | NE ² |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus atrogularis</i> | Grive à gorge noire | | | | | NA ^d | NE ² |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus iliacus</i> | Grive mauvis | | | | LC | NA ^d | NT |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus merula</i> | Merle noir | LC | | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus philomelos</i> | Grive muscienne | LC | | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus pilaris</i> | Grive litorne | LC | | → | LC | | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus torquatus</i> | Merle à plastron | LC | | → | | DD | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus viscivorus</i> | Grive draine | LC | | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Scotocercidae | <i>Cettia cetti</i> | Bouscarle de Cetti | NT | pr. A2b | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Cisticolidae | <i>Cisticola juncidis</i> | Cisticole des joncs | VU | A2b | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella luscinioides</i> | Locustelle lusciniôïde | EN | A2b | ↘ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella naevia</i> | Locustelle tachetée | NT | pr. A2b | ↘ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Rousserolle turdoïde | VU | A2b C1 | ↘ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Lusciniole à moustaches | EN | A2b | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Phragmite aquatique | | | | | VU A2b | VU |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus palustris</i> | Rousserolle verderolle | LC | | → | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Phragmite des joncs | LC | | → | | DD | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Rousserolle effarvate | LC | | ? | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais icterina</i> | Hypolais ictérine | VU | A2b | ↘ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais polyglotta</i> | Hypolais polyglotte | LC | | ↗ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia atricapilla</i> | Fauvette à tête noire | LC | | ↗ | NA ^c | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia borin</i> | Fauvette des jardins | NT | pr. A2b | ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia cantillans</i> | Fauvette passerinette | LC | | ↗ | | | NE ¹ |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia communis</i> | Fauvette grisette | LC | | → | | DD | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia conspicillata</i> | Fauvette à lunettes | EN | A2b | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia curruca</i> | Fauvette babillarde | LC | | → | | NA ^d | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia hortensis</i> | Fauvette orphée | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia melanocephala</i> | Fauvette mélanocéphale | NT | pr. A2b ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia sarda</i> | Fauvette sarde | LC | ? | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia subalpina</i> | Fauvette de Moltoni | LC | ? | | | NE ² |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia undata</i> | Fauvette pitchou | EN | A2b ↘ | | | NT |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Pouillot de Bonelli | LC | ↗ | | NA ^d | NE ¹ |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus collybita</i> | Pouillot véloce | LC | ↘ | NA ^d | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus ibericus</i> | Pouillot ibérique | EN | C2a(i) ↘ | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Pouillot siffleur | NT | pr. A2b → | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Pouillot fitis | NT | pr. A2b ↘ | | DD | LC |
| Passeriformes | Regulidae | <i>Regulus ignicapilla</i> | Roitelet à triple bandeau | LC | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Regulidae | <i>Regulus regulus</i> | Roitelet huppé | NT | pr. A2b ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Panuridae | <i>Panurus biarmicus</i> | Panure à moustaches, Mésange à moustaches | LC | ↗ | | | LC |
| Passeriformes | Leiothrichidae | <i>Leiothrix lutea</i> | Léiothrix jaune | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Aegithalidae | <i>Aegithalos caudatus</i> | Mésange à longue queue | LC | ↘ | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mésange bleue | LC | ? | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Lophophanes cristatus</i> | Mésange huppée | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Parus major</i> | Mésange charbonnière | LC | ↗ | NA ^b | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Periparus ater</i> | Mésange noire | LC | → | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile montanus</i> | Mésange boréale | VU | A2b ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile palustris</i> | Mésange nonnette | LC | ↗ | | | LC |
| Passeriformes | Sittidae | <i>Sitta europaea</i> | Sittelle torchepot | LC | ↗ | | | LC |
| Passeriformes | Sittidae | <i>Sitta whiteheadi</i> | Sittelle corse | VU | C1+2a(ii) ↘ | | | VU |
| Passeriformes | Sittidae | <i>Tichodroma muraria</i> | Tichodrome échelette | NT | pr. D1 ? | | | LC |
| Passeriformes | Certhiidae | <i>Certhia brachydactyla</i> | Grimpereau des jardins | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Certhiidae | <i>Certhia familiaris</i> | Grimpereau des bois | LC | → | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Remizidae | <i>Remiz pendulinus</i> | Rémiz penduline, Mésange rémiz | CR | D ? | | DD | LC |
| Passeriformes | Oriolidae | <i>Oriolus oriolus</i> | Loriot d'Europe | LC | ↗ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius collurio</i> | Pie-grièche écorcheur | NT | pr. A2b ↘ | NA ^c | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius excubitor</i> | Pie-grièche grise | EN | A2b ↘ | NA ^d | | NE ¹ |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius meridionalis</i> | Pie-grièche méridionale | EN | C2a(i) ↘ | | | NE ² |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius minor</i> | Pie-grièche à poitrine rose | CR | A2a B2ab(ii,v) C(1+2)a(i) D ↘ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius senator</i> | Pie-grièche à tête rousse | VU | A2b ↘ | | NA ^d | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus corax</i> | Grand Corbeau | LC | ↗ | | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus corone</i> | Corneille noire | LC | → | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus frugilegus</i> | Corbeau freux | LC | → | LC | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus monedula</i> | Choucas des tours | LC | ↗ | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Garrulus glandarius</i> | Geai des chênes | LC | → | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Cassenoix moucheté | LC | → | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Pica pica</i> | Pie bavarde | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | Chocard à bec jaune | LC | ? | | | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Crave à bec rouge | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Sturnus unicolor</i> | Etourneau unicolore | LC | ? | | | LC |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Sturnus vulgaris</i> | Etourneau sansonnet | LC | ↘ | LC | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Montifringilla nivalis</i> | Niverolle alpine | LC | ? | | | LC |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer domesticus</i> | Moineau domestique | LC | → | | NA ^b | NE ¹ |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer hispaniolensis</i> | Moineau espagnol | NA ^b | | | | LC |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer italiae</i> | Moineau cisalpin | LC | ? | | | NE ² |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer montanus</i> | Moineau friquet | EN | A2b ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Petronia petronia</i> | Moineau soulcie | LC | → | | | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Euodice malabarica</i> | Capucin bec-de-plomb | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis cannabina</i> | Linotte mélodieuse | VU | A2b ↘ | NA ^d | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis carduelis</i> | Chardonneret élégant | VU | A2b ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis chloris</i> | Verdier d'Europe | VU | A2b ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis citrinella</i> | Venturon montagnard | NT | pr. A2bc ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis corsicana</i> | Venturon corse | LC | ? | | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis flammea</i> | Sizerin flammé | VU | A2b C1 ↘ | NA ^d | NA ^d | NE ¹ |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis flavirostris</i> | Linotte à bec jaune | | | NA ^c | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis spinus</i> | Tarin des aulnes | LC | ? | DD | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Roselin cramoisi | DD | ? | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Grosbec casse-noyaux | LC | ↗ | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Fringilla coelebs</i> | Pinson des arbres | LC | ↗ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Fringilla montifringilla</i> | Pinson du Nord | | | DD | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia curvirostra</i> | Bec-croisé des sapins | LC | → | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Bouvreuil pivoine | VU | A2b ↘ | NA ^d | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Serinus serinus</i> | Serin cini | VU | A2b ↘ | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Calcarius lapponicus</i> | Bruant lapon | | | NA ^c | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza calandra</i> | Bruant proyer | LC | → | | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Oiseaux nicheurs | | Oiseaux hivernants | Oiseaux de passage | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|-------------|-------------------------------|----------------------|--|-------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | | Catégorie et critère Liste rouge France | Catégorie et critère Liste rouge France | |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza cia</i> | Bruant fou | LC | ↘ | | | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza cirlus</i> | Bruant zizi | LC | → | | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza citrinella</i> | Bruant jaune | VU | A2b ↘ | NA ^d | NA ^d | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza hortulana</i> | Bruant ortolan | EN | A2b ↘ | | EN A2b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza melanocephala</i> | Bruant mélanocéphale | NA ^b | | | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Bruant des roseaux | EN | A2b ↘ | | NA ^c | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Plectrophenax nivalis</i> | Bruant des neiges | | | NA ^c | NA ^c | LC |

Liste des espèces de métropole présentes uniquement en passage de manière occasionnelle ou marginale

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas carolinensis</i> | Sarcelle à ailes vertes | NA ^b | NE ² |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas rubripes</i> | Canard noir | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser caerulescens</i> | Oie des neiges | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser erythropus</i> | Oie naine | NA ^b | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya affinis</i> | Fuligule à tête noire | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Branta ruficollis</i> | Bernache à cou roux | NA ^b | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Bucephala albeola</i> | Garrot albéole | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Bucephala islandica</i> | Garrot d'Islande | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Mareca americana</i> | Canard à front blanc | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta americana</i> | Macreuse à bec jaune | NA ^b | NT |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta deglandi</i> | Macreuse à ailes blanches | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Melanitta perspicillata</i> | Macreuse à front blanc | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Polysticta stelleri</i> | Eider de Steller | NA ^b | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Sibirionetta formosa</i> | Sarcelle élégante | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Somateria spectabilis</i> | Eider à tête grise | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Spatula discors</i> | Sarcelle à ailes bleues | NA ^b | LC |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podilymbus podiceps</i> | Grèbe à bec bigarré | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Diomedidae | <i>Thalassarche melanophris</i> | Albatros à sourcils noirs | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Bulweria bulwerii</i> | Pétrel de Bulwer | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Macronectes giganteus</i> | Fulmar géant | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Macronectes halli</i> | Fulmar de Hall | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma feae</i> | Pétrel gongon | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma madeira</i> | Pétrel de Madère | NA ^b | EN |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus baroli</i> | Puffin de Macaronésie | NA ^b | NE ² |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanites oceanicus</i> | Océanite de Wilson | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma castro</i> | Océanite de Castro | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Océanite culblanc | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma monorhis</i> | Océanite de Swinhoe | NA ^b | NT |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Sula dactylatra</i> | Fou masqué | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax auritus</i> | Cormoran à aigrettes | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | Cormoran pygmée | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Pelecanidae | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Pélican blanc | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Fregatidae | <i>Fregata magnificens</i> | Frégate superbe | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea herodias</i> | Grand Héron | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Ardea melanocephala</i> | Héron mélanocéphale | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Butorides virescens</i> | Héron vert | NA ^b | LC |
| Pelecaniformes | Ardeidae | <i>Egretta gularis</i> | Aigrette des récifs | NA ^b | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila adalberti</i> | Aigle ibérique | NA ^b | VU |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila clanga</i> | Aigle criard | NA ^b | VU |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila heliaca</i> | Aigle impérial | NA ^b | VU |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Aquila nipalensis</i> | Aigle des steppes | NA ^b | EN |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus macrourus</i> | Busard pâle | NA ^b | NT |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Torgos tracheliotus</i> | Vautour oricou | NA ^b | EN |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco biarmicus</i> | Faucon lanier | NA ^b | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco cherrug</i> | Faucon sacré | NA ^b | EN |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco concolor</i> | Faucon concolore | NA ^b | NT |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco eleonorae</i> | Faucon d'Éléonore | NA ^b | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco rusticolus</i> | Faucon gerfaut | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica cristata</i> | Foulque caronculée | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio alleni</i> | Talève d'Allen | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana carolina</i> | Marouette de Caroline | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Gruidae | <i>Grus canadensis</i> | Grue du Canada | NA ^b | LC |
| Gruiformes | Otididae | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | Outarde de Macqueen | NA ^b | VU |
| Charadriiformes | Glareolidae | <i>Cursorius cursor</i> | Courvite isabelle | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Glareolidae | <i>Glareola nordmanni</i> | Glaréole à ailes noires | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius asiaticus</i> | Pluvier asiatique | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Gravelot de Leschenault | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius mongolus</i> | Gravelot mongol | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius pecuarius</i> | Gravelot pâtre | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius vociferus</i> | Gravelot kildir | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis dominica</i> | Pluvier bronzé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis fulva</i> | Pluvier fauve | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus gregarius</i> | Vanneau sociable | NA ^b | CR |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Vanellus leucurus</i> | Vanneau à queue blanche | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Actitis macularius</i> | Chevalier grivelé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Bartramia longicauda</i> | Bartramie des champs | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris acuminata</i> | Bécasseau à queue pointue | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris bairdii</i> | Bécasseau de Baird | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris fuscicollis</i> | Bécasseau de Bonaparte | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris himantopus</i> | Bécasseau à échasses | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris mauri</i> | Bécasseau d'Alaska | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris melanotos</i> | Bécasseau tacheté | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris minutilla</i> | Bécasseau minuscule | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris pusilla</i> | Bécasseau semipalmé | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris ruficollis</i> | Bécasseau à cou roux | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Catoptrophorus semipalmatus</i> | Chevalier semipalmé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago delicata</i> | Bécassine de Wilson | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago media</i> | Bécassine double | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limicola falcinellus</i> | Bécasseau falcinelle | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus griseus</i> | Bécassin à bec court | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Bécassin à long bec | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius tenuirostris</i> | Courlis à bec grêle | NA ^b | CR |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus lobatus</i> | Phalarope à bec étroit | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus tricolor</i> | Phalarope de Wilson | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Scolopax minor</i> | Bécasse d'Amérique | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa flavipes</i> | Petit Chevalier à pattes jaunes | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa melanoleuca</i> | Grand Chevalier à pattes jaunes | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa solitaria</i> | Chevalier solitaire | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa stagnatilis</i> | Chevalier stagnatile | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tryngites subruficollis</i> | Bécasseau rousset | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Xenus cinereus</i> | Chevalier bargette | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus philadelphia</i> | Mouette de Bonaparte | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus atricilla</i> | Mouette atricille | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus delawarensis</i> | Goéland à bec cerclé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus glaucooides</i> | Goéland à ailes blanches | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus ichthyaetus</i> | Goéland ichthyaète | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus pipixcan</i> | Mouette de Franklin | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus smithsonianus</i> | Goéland d'Amérique | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Onychoprion anaethetus</i> | Sterne bridée | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Sterne fuligineuse | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Pagophila eburnea</i> | Mouette ivoire | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Rhodostethia rosea</i> | Mouette de Ross | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna bengalensis</i> | Sterne voyageuse | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna elegans</i> | Sterne élégante | NA ^b | NT |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna forsteri</i> | Sterne de Forster | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Sterna maxima</i> | Sterne royale | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Xema sabini</i> | Mouette de Sabine | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Alcidae | <i>Uria lomvia</i> | Guillemot de Brünnich | NA ^b | LC |
| Pterocliiformes | Pterocliidae | <i>Syrrhaptes paradoxus</i> | Syrrhapte paradoxal | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia orientalis</i> | Tourterelle orientale | NA ^b | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus americanus</i> | Coulicou à bec jaune | NA ^b | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Bubo scandiacus</i> | Harfang des neiges | NA ^b | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Surnia ulula</i> | Chouette épervière | NA ^b | LC |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Caprimulgus ruficollis</i> | Engoulevent à collier roux | NA ^b | LC |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles minor</i> | Engoulevent d'Amérique | NA ^b | LC |
| Caprimulgiformes | Apodidae | <i>Apus affinis</i> | Martinet des maisons | NA ^b | LC |
| Caprimulgiformes | Apodidae | <i>Chaetura pelagica</i> | Martinet ramoneur | NA ^b | NT |
| Coraciiformes | Meropidae | <i>Merops persicus</i> | Guêpier de Perse | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Calandrella rufescens</i> | Alouette piskolette | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Alaudidae | <i>Chersophilus duponti</i> | Sirli de Dupont | NA ^b | NT |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> | Hirondelle à front blanc | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Riparia paludicola</i> | Hirondelle paludicole | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus godlewskii</i> | Pipit de Godlewski | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus gustavi</i> | Pipit de la Petchora | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus hodgsoni</i> | Pipit à dos olive | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus richardi</i> | Pipit de Richard | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Anthus rubescens</i> | Pipit farlousane | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Motacillidae | <i>Motacilla citreola</i> | Bergeronnette citrine | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Bombycillidae | <i>Bombycilla garrulus</i> | Jaseur boréal | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Prunellidae | <i>Prunella atrogularis</i> | Accenteur à gorge noire | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula parva</i> | Gobemouche nain | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula semitorquata</i> | Gobemouche à demi-collier | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia luscinia</i> | Rossignol progné | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe deserti</i> | Traquet du désert | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe isabellina</i> | Traquet isabelle | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe leucopyga</i> | Traquet à tête blanche | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe pleschanka</i> | Traquet pie | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus minimus</i> | Grive à joues grises | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus ustulatus</i> | Grive à dos olive | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Agrobate roux | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Tarsiger cyanurus</i> | Robin à flancs roux | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus eunomus</i> | Grive à ailes rousses | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus naumanni</i> | Grive de Naumann | NA ^b | NE ¹ |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus obscurus</i> | Grive obscure | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus ruficollis</i> | Grive à gorge rousse | NA ^b | NE ¹ |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Zoothera dauma</i> | Grive dorée | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Passeriformes | Turdidae | <i>Zoothera sibirica</i> | Grive de Sibérie | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella certhiola</i> | Locustelle de Pallas | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella fasciolata</i> | Locustelle fasciée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella fluviatilis</i> | Locustelle fluviatile | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Locustellidae | <i>Locustella lanceolata</i> | Locustelle lancéolée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus agricola</i> | Rousserolle isabelle | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Acrocephalus dumetorum</i> | Rousserolle des buissons | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais caligata</i> | Hypolaïs bottée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais opaca</i> | Hypolaïs obscure | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais pallida</i> | Hypolaïs pâle | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Acrocephalidae | <i>Hippolais rama</i> | Hypolaïs rama | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia deserti</i> | Fauvette du désert | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia nana</i> | Fauvette naine | NA ^b | NE ¹ |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia nisoria</i> | Fauvette épervière | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Sylvia rueppelli</i> | Fauvette masquée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus borealis</i> | Pouillot boréal | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | Pouillot brun | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus humei</i> | Pouillot de Hume | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus inornatus</i> | Pouillot à grands sourcils | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus nitidus</i> | Pouillot du Caucase | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus orientalis</i> | Pouillot oriental | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> | Pouillot à pattes sombres | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus proregulus</i> | Pouillot de Pallas | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus schwarzi</i> | Pouillot de Schwarz | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Phylloscopidae | <i>Phylloscopus trochiloides</i> | Pouillot verdâtre | NA ^b | NE ¹ |
| Passeriformes | Paridae | <i>Cyanistes cyanus</i> | Mésange azurée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius cristatus</i> | Pie-grièche brune | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius isabellinus</i> | Pie-grièche isabelle | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Laniidae | <i>Lanius nubicus</i> | Pie-grièche masquée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus dauuricus</i> | Choucas de Daourie | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Sturnus roseus</i> | Martin roselin | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo olivaceus</i> | Viréo à œil rouge | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Bucanetes githagineus</i> | Roselin githagine | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis hornemanni</i> | Sizerin blanchâtre | NA ^b | NE ² |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia leucoptera</i> | Bec-croisé bifascié | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | Bec-croisé perroquet | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Pinicola enucleator</i> | Durbec des sapins | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Passeriformes | Parulidae | <i>Dendroica striata</i> | Paruline rayée | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parula americana</i> | Paruline à collier | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Seiurus noveboracensis</i> | Paruline des ruisseaux | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga ruticilla</i> | Paruline flamboyante | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Piranga olivacea</i> | Tangara écarlate | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza aureola</i> | Bruant auréole | NA ^b | EN |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza bruniceps</i> | Bruant à tête rousse | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza caesia</i> | Bruant cendrillard | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza chrysophrys</i> | Bruant à sourcils jaunes | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza leucocephalos</i> | Bruant à calotte blanche | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza pusilla</i> | Bruant nain | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza rustica</i> | Bruant rustique | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza rutila</i> | Bruant roux | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza spodocephala</i> | Bruant masqué | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | Cardinal à poitrine rose | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Zonotrichia albicollis</i> | Bruant à gorge blanche | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Zonotrichia leucophrys</i> | Bruant à couronne blanche | NA ^b | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Goglu des prés | NA ^b | LC |

Liste des sous-espèces ou populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

| Ordre | Nom scientifique | Sous-espèce ou population | Nom commun | Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France | Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France | Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Anseriformes | <i>Anser fabalis</i> | Ssp. <i>fabalis</i> | Oie de taïga | | RE | |
| Anseriformes | <i>Anser fabalis</i> | Ssp. <i>rossicus</i> | Oie de toundra | | VU B1ab(iv,v) | NA ^b |
| Anseriformes | <i>Branta bernicla</i> | Ssp. <i>bernicla</i> | Bernache cravant | | LC | |
| Anseriformes | <i>Branta bernicla</i> | Ssp. <i>hrota</i> | Bernache à ventre pâle | | VU D1 | |
| Anseriformes | <i>Branta bernicla</i> | Ssp. <i>nigricans</i> | Bernache du Pacifique | | NA ^c | |
| Galliformes | <i>Lagopus muta</i> | Ssp. <i>helvetica</i> | Lagopède alpin (Alpes) | NT pr. C1 ↘ | | |
| Galliformes | <i>Lagopus muta</i> | Ssp. <i>pyrenaica</i> | Lagopède alpin (Pyrénées) | NT pr. B1b(iii) C1 ↘ | | |
| Galliformes | <i>Perdix perdix</i> | Ssp. <i>hispaniensis</i> | Perdrix grise des Pyrénées, Perdrix grise de montagne | NT pr. C1 ? | | |
| Galliformes | <i>Perdix perdix</i> | Ssp. <i>perdix</i> | Perdrix grise de plaine | LC ↘ | | |
| Galliformes | <i>Tetrao urogallus</i> | Ssp. <i>aquitanicus</i> | Grand Tétras (Pyrénées) | VU C1 → | | |
| Galliformes | <i>Tetrao urogallus</i> | Ssp. <i>urogallus</i> | Grand Tétras (Vosges, Jura, Cévennes) | EN C2a(i) ↘ | | |
| Procellariiformes | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Ssp. <i>melitensis</i> | Océanite tempête, Pétrel tempête | CR A2a ? | | |
| Procellariiformes | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Ssp. <i>pelagicus</i> | Océanite tempête, Pétrel tempête | VU B2ab(iii) ? | | |
| Accipitriformes | <i>Accipiter gentilis</i> | Ssp. <i>arrigonii</i> | Autour des palombes | EN D ? | | |
| Otidiformes | <i>Tetrax tetrax</i> | Pop. centre-ouest | Outarde canepetière | CR A2a ↘ | | |
| Otidiformes | <i>Tetrax tetrax</i> | Pop. méditerranéenne | Outarde canepetière | LC ↗ | | |
| Charadriiformes | <i>Calidris canutus</i> | Ssp. <i>canutus</i> | Bécasseau maubèche | | | DD |
| Charadriiformes | <i>Calidris canutus</i> | Ssp. <i>islandica</i> | Bécasseau maubèche d'Islande | | NT pr. D2 | |
| Charadriiformes | <i>Limosa limosa</i> | Ssp. <i>islandica</i> | Barge à queue noire d'Islande | | NT pr. D2 | |
| Charadriiformes | <i>Limosa limosa</i> | Ssp. <i>limosa</i> | Barge à queue noire | VU B2ab(ii,iii,iv) D1 → | | VU B2ab(v) |
| Passeriformes | <i>Muscicapa striata</i> | Ssp. <i>tyrrhenica</i> | Gobemouche gris (Corse) | DD ? | | |
| Passeriformes | <i>Lanius senator</i> | Ssp. <i>badius</i> | Pie-grièche à tête rousse (Corse) | NT pr. B2b(iii) ↘ | | |
| Passeriformes | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Ssp. <i>witherbyi</i> | Bruant des roseaux (Méditerranée) | EN B(1+2)ab(iii,v) ↘ | | |

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Oiseaux de France métropolitaine

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur de l'UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur du SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Hélène Colas (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Arzhvaël Jousset (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Jacques Comolet-Tirman (MNHN)

Comité d'évaluation

Experts : Guillaume Body (ONCFS), Bernard Deceuninck (LPO), Yves Ferrand (ONCFS), Nidal Issa (LPO), Frédéric Jiguet (MNHN), Jean Emmanuel Roché (SEOF), Jean-Philippe Sibley (MNHN)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Remerciements

Yves Muller (LPO / SEOF), Claude Novoa (ONCFS)

Réalisation du document - Hélène Colas (UICN France)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

| | |
|-----------|--------------------|
| CR | En danger critique |
| EN | En danger |
| VU | Vulnérable |

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis)

NE : Non évaluée (car (1) espèce présente dans la Liste rouge mondiale mais sous un autre périmètre taxonomique, (2) espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Pouillot ibérique → Catégorie : EN ; Critère : C2a(i)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Fuligule milouinan → Catégorie : NT ; Critères : pr. B2ac(iv) D1

- Pour les espèces dont l'évaluation en métropole a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Hibou des marais → Catégorie : VU ; Critère : EN D (-1)

Tendance d'évolution des populations

↗ : En augmentation ↘ : En diminution → : Stable ? : Inconnue

Citation des résultats : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.